



Insectes piquants: que faire pour se prémunir ?

Si les piqûres d'aoûtats, de taons,
sont le plus souvent bénignes,
elles deviennent dangereuses quand elles sont
nombreuses ou se situent dans la gorge,
la bouche, sur le visage ou le cou.



Les Mutualités Neutres

VOTRE LIBERTE, VOTRE SECURITE

www.mutualites-neutres.be

Ch. de Charleroi 145 - 1060 Bruxelles



Aoûtat.

C'est de mai à septembre que l'on rencontre cet insecte dans les prairies, les jardins et certaines forêts. La larve microscopique de cet acaridien s'accroche sur la peau découverte, grimpe le long des membres, sur les vêtements et se localise aux endroits où les habits sont serrés (taille,...).

Pour s'en protéger : des produits répulsifs, une couverture ou une serviette posée sur l'herbe. Il faut calmer l'irritation de la peau et éviter de se gratter. Si les démangeaisons sont intolérables, on peut appliquer une pommade anti-histaminique ou suivre un traitement par corticoïdes.

Guêpe et abeille.

Les parfums et les couleurs vives ne sont pas conseillés. Afin d'éviter d'en avaler une, il est recommandé de ne pas boire à même l'ouverture d'une bouteille ou d'une boîte métallique. Comme les guêpes sont attirées par les vives, couvrons bien ces dernières.

Dans les cas bénins de piqûre, retirons le dard avec une pince à épiler ou une aiguille que nous aurons d'abord passée à la flamme. Désinfectons ensuite et appliquons éventuellement une pommade calmante. Si une personne est allergique, il faut l'allonger à l'ombre et appeler les urgences. A noter qu'un nid de guêpes s'élimine plus facilement le soir ou le matin. Quand elles sont vives, il faut découper le nid d'un coup et veiller à ce que ce dernier tombe dans un récipient que l'on peut fermer. Comme l'élimination d'un nid n'est jamais sans risque, il est parfois préférable de faire appel à un apiculteur ou aux pompiers.

Moustique.

Essence de citronnelle ou de géranium, pommades, moustiquaires, diffuseurs électriques, bombes insecticides, tortillons fumigènes, produits à base d'essence de lemon eucalyptus ont leur intérêt. Chaque méthode doit être utilisée en fonction du lieu où l'on se trouve.

Taon.

Affectionnant toute peau mouillée, il faut profiter du court instant où il palpe l'endroit où il va planter sa trompe, pour le chasser.

Tique.

Dans les sous-bois, broussailles, il est préférable de ne pas marcher jambes nues. Pouvant transmettre des maladies infectieuses, il faut toujours l'endormir avant de l'ôter avec une pince à épiler. La bouche doit être entre les pinces. Si une tache rouge apparaît, il y a lieu de consulter un médecin qui prescrira des antibiotiques.